



## Diflucan advertisement.

[s.l.]: [s.n.], 1921

<https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/YD5SNFUADBSBN82>

<http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/>

The libraries provide public access to a wide range of material, including online exhibits, digitized collections, archival finding aids, our catalog, online articles, and a growing range of materials in many media.

When possible, we provide rights information in catalog records, finding aids, and other metadata that accompanies collections or items. However, it is always the user's obligation to evaluate copyright and rights issues in light of their own use.

**DIFLUCAN** 150 mg  
fluconazol

# En helt ny och enklare princip att behandla genitala Candida infektioner

## En enda kapsel är allt som behövs

DIFLUCAN är det första perorala antimykotiska medlet för behandling av genitala Candida infektioner i Sverige. Enbart en 150 mg kapsel av DIFLUCAN har effekt på Candida både genitalt och extragenitalt. Detta resulterar i hög utläkningsfrekvens med låg risk för recidiv.

Omfattande kliniska studier har visat att DIFLUCAN ger en utläkningsfrekvens på över 90%. Jämförande studier har visat att DIFLUCAN ger en snabbare lindring än clotrimazole vagitorier (Canesten®) vid symptom som klåda och sveda<sup>2)</sup>. Vid långtidsuppföljning har DIFLUCAN visat en bättre klinisk effekt än clotrimazole vagitorier<sup>2)</sup>.


DIFLUCAN underlättar också behandlingen och ger maximal compliance. Patienten slipper problem med vaginal applikation och upp-repade doseringar. DIFLUCAN minskar dess-utom behovet av kombinationsbehandling med vagitorier och krämer.

DIFLUCAN har en selektiv effekt på svampceller, med liten eller ingen effekt på human- och bakterieceller<sup>1)</sup>. Biverkningarna är få.

DIFLUCAN påverkar inte den endogena steroidmetabolismen och interaktion med orala antikonceptionsmedel har inte påvisats.

DIFLUCAN bör tillsvidare inte ges till barn. Erfarenheterna av behandling under graviditet är begränsade och behandling av gravida ska undvikas.

- **En enda oral dos.**
- **Högeffektivt.**
- **Snabb effekt på klåda och sveda.**
- **Förbättrad långtidseffekt<sup>2)</sup>.**
- **Få och milda biverkningar.**



**Pfizer**



## Diflucan

Pfizer

Kapslar 150 mg

Antimykotikum för systemiskt bruk

**Deklaration.** 1 kapsel 150 mg innehåller: Fluconazol, 150 mg, lactos, 146 mg, constit, et color (titandioxid) q.s.

**Egenskaper.** Fluconazol är ett triazolderivat med fungistatisk effekt, som specifikt hämmar svampens ergosterolsyntes vilket leder till defekter i cellmembranen. Fluconazol är i hög grad specifikt för svampens cytokerom P-450 beroende enzym. Fluconazol har inte visats påverka serumnivån av testosteron hos män eller steroid koncentrationen hos fertila kvinnor.

Verkningsspektrum omfattar ett flertal patogena svampar inkluderande candida albicans och andra candida-arter, cryptococcus-arter samt dermatofyter. I de kliniska studier som gjorts med Diflucan har ingen resistensutveckling påvisats, men i litteraturen finns ett fall rapporterat.

Fluconazol har efter peroral administrering en biotillgänglighet på mer än 90 %. Absorptionsgraden påverkas inte nämnvärt av samtidigt födointag. Maximal serumkoncentration uppnås i regel efter 1/2 till 1 1/2 timme. Bindningen till plasma-proteiner är ca 12 %. Distributionsvolymen motsvarar den totala kroppsvätskan, 0,7 l/kg. Halveringstiden är ca 30 timmar. Plasmakoncentrationen är proportionell till dosen vilket har visats i dosintervallet 25–200 mg.

Fluconazol utsöndras huvudsakligen via njurarna. 80 % av dosen återfinns i urinen i oförändrad form. Dessutom utsöndras i urinen ca 10 % av dosen i form av metaboliter. utsönd-

ringen av fluconazol är proportionell mot kreatinin-clearance.

**Indikationer.** Vaginal candidiasis.

**Försiktighet.** Tills ytterligare erfarenhet erhållits bör fluconazol inte ges till barn.

**Graviditet.** Kategori B:3 (se FASS). Erfarenheter från mänskliga är begränsade. Vid upprepad dosering i doser som överskrider humandomsen har i djurförsök på rätta påvisats ökad intrauterin fosterdöd, en effekt som också påvisats med imidazolpreparat, samt ökad förekomst av urinvägsmmissbildningar (hydronefros och hydrouretär).

**Amning.** Uppgift saknas om fluconazol passerar över i modersmjölk.

**Biverkningar.** I kliniska prövningar har upp till 9 % upplevt biverkningar.

Vanliga CNS: huvudvärk

GI: illamående, magsmärtor

**Dosering.** 150 mg som engångsdos.

Vid reducerad njurturktion behöver dosen inte justeras efter som det rör sig om engångsdosering.

**Interaktioner.** Fluconazol interagerar med tolbutamid och warfarin. Fluconazol förlänger koagulerstiden hos warfarinbehandlade patienter. Vid samtidig behandling med fluconazol och kumarinpreparat bör en noggrann titrering av antikoagulantia-dosen göras. Fluconazol förlänger halveringstiden av samtidigt given tolbutamid. Någon effekt på serum-glukosnivåerna har dock inte setts.

**Förpackning.** Kapslar 150 mg (vita märkta FLU-150 och Pfizer-symbol). 1 st (tryckpack).

1. Marriott M.S., Richardson K.: The discovery, and mode of action of fluconazole. Recent Trends in the Discovery, Development and Evaluation of Antifungal Agents. R.A Fromting (Ed.).J.R. Prous Science Publishers. S.A.,1987.
2. Lassus A.: A comparison of single dose oral fluconazole with three-day intravaginal clotrimazole in the treatment of vaginal candidiasis: Report of an international multicenter trial. Br J Obstet Gynaecol 96:226-232, 1989. Jämförande studie mellan DIFLUCAN 150 mg i engångsdos och clotrimazole vagitoner 200 mg i 3 dagar på totalt 369 patienter med genital Candida infektion. Behandlingsresultaten utvärderades kliniskt och mykologiskt efter 7 dagar samt efter 5-7 veckor.

Ett originalpreparat från



Box 501  
183 25 Täby